

VITASEPT[®]H

Odos antiseptikas

Produkta savybės

- bespalvis
- greitas ir veiksmingas poveikis
- nepažeidžia odos
- netinka naudoti kaip atvirų žaizdų ir gleivinės antiseptiką!

Sudėtis

izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%, ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%

Poveikio spektras

Bakterijos: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.* (MRSA), *Streptococcus spp.*, *Listeria spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* ir t.t.

Virusai: hepatito B ir C virusai, ŽIV, adeno, rota, gripo virusas (taip vadinamas kiaulių gripas) ir t.t.

Grybeliai: *Candida albicans*

Poveikio trukmė

Baktericidinis EN 13727, EN 1276	15 sek
Fungicidinis EN 1275	30 sek
Tuberkulicidinis EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Su apvaskalvū virusus	
ŽIV, hepatito B ir C virusai	15 sek
Vaccinia virusas	15 sek
A-virusas (Influenza)	15 sek
Gripo virusas	15 sek
Be apvaskalvū virusus	
Rota virusas	30 sek
Adeno virusas	60 sek

Naudojimas

Odos dezinfekavimui prieš suleidžiant vaistus švirkštu ar imant kraują:

Užpurškite priemonės Vitasept[®]H ant švirkštu duriamos vaistų suleidimo ar kraujo ėmimo vietos, nuvalykite tamponu, užpurškite priemonės dar kartą ir leiskite tirpalui išdžiūti. Veikimo trukmė 15 sek.

Antiseptiniam odos apdorojimui prieš operaciją:
Odos vieta apdorojama du kartus. Incizijos plėvelę galima lipdyti tik ant sausos odos. Veikimo trukmė 90 sek.

Kaip odos antiseptikas vabzdžių įgėlimus:

Purkšti ant odos ir palaukti, kol išdžius.

Nagų antiseptikas darant manikiūrą:

Prieš pradėdant procedūrą purkšti ant pirštų taip, kad nagai būtų padengti priemone, ir palaukti, kol išdžius. Tinka naudoti kaip odos antiseptikas darant parafino vones, tatuiruotes, ilgalaikį makiažą, modeliuojant antakius ir pan.

Įspėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *bespalvis, aiškus skystis*

Kvapas: *specifinis (alkoholis)*

Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atitiktis standartams

EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1275

Kiti bandymų būdai

DVV/RKI

Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:

(A-01PNO601355-14-159)-BSV-6869

Pakuotė

150ml butelis su purškikliu

1L butelis

5L kanistras