

VITASEPT[®]H

Antiseptiķis ādai

Produkta īpašības

- bezkrāsas
- iedarbojas ātri un efektīvi
- nebojā ādu
- nav piemērots brūču un gļotādu antiseptikai!

Sastāvs

izopropanols 60%, etanols (denat.) 15%,
četrreizvietotie amonija savienojumi 0,2%

Iedarbības spektrs

Baktērijas: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* u.c.

Vīrusi: HBV, HCV, HIV, Adeno vīruss, Rota vīruss, Influenza vīrusi (t. sk. tā sauktā cūku gripa) u.c.

Sēnītes: *Candida albicans*

Iedarbības laiks

Baktericīda EN 13727, EN 1276	15 sek
Fungicīda EN 1275	30 sek
Tuberkulocīda EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Apvalkotie vīrusi	
HIV, HBV, HCV	15 sek
Vaccinia vīruss	15 sek
Influenza vīrusi (A vīruss)	15 sek
Influenza vīrusi	15 sek
Neapvalkotie vīrusi	
Rota vīruss	30 sek
Adeno vīruss	60 sek

Lietošana

Ādas antiseptikai pirms injekcijām un asins
ņemšanas:

Uzsmidzināt produktu uz tampona, attīrīt apstrādājamo zonu, uzsmidzināt līdzekli uz ādas un ļaut šķīdumam nožūt. Iedarbības laiks 15 sek.

Ādas antiseptika pirms operācijām:

Zona ir jāapstrādā ar šķīdumu vismaz divas reizes. Incīziju plēvi var līmēt tikai uz sausas ādas. Iedarbības laiks 90 sek.

Izmanto ādas antiseptikai kukaiņu kodumu
gadījumā:

Uzsmidzināt uz ādas un ļaut nožūt.

Nagu antiseptika manikīra laikā:

Pirms procedūras uzsmidzināt uz pirkstiem tā, lai nagi būtu pārklāti ar līdzekli, un ļaut nožūt. Piemērots arī ādas antiseptikai pirms parafīna procedūras, tetovēšanas, permanentā meikapa, uzacu modelēšanas u.tml.

Brīdinājums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Fizikālais stāvoklis: *bezkrāsains, skaidrs šķidrums*

Smarža: *specifiska (raksturīga alkoholam)*

Šķīdība ūdenī: *pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās*

Blīvums: *0,84 – 0,87 g/cm³ (20°C)*

Uzglabāšana

Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules staros.

Atbilstība standartiem

EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 14348,
EN 14476, EN 1275

Citas testa metodes

DVV/RKI

Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.:

LV13022013/992

Iepakojums

150ml pudele ar izsmidzinātāju

1L pudele

5L skārda kārba