

Rankų antiseptikas

Produkto savybės

- platus priešmikrobinis poveikis
- greitas poveikis (30 sek)
- ilgalaikis poveikis (3 val.)
- nesusausina rankų– sudėtyje yra odos priežiūros agentų
- praėjus veikimo laikui greitai atsinaujina normali odos mikroflora.
- sudėtyje nėra kvapiųjų medžiagų ir dažiklių

Vitasept® tai veiksminga, plataus veikimo spektro antiseptinė rankų priemonė, kuri naudojama medicinoje, rankų higienai ir chirurginiam dezinfekavimui, taip pat ir privačiame sektoriuje, gyventojų sveikatos apsaugos tikslais.

Sudėtis

izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15%, ketvirtiniai amonio junginiai 0,2%, odos priežiūros agentai

Poveikio spektras

Bakterijos: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp* (MRSA), *Streptococcus spp*, *Listeria spp*, *Enterococcus faecalis*, *Acinetobacter baumannii*, *Corynebacterium ammoniagenes*, *Mycoplasma spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter aerogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Serratia marcescens*, *Shigella dysenteriae*, *Vibrio cholerae*, *Bacillus cereus*, *Mycobacterium*, *Clostridium spp* ir t.t

Virusai: hepatito B ir C virusai, ŽIV, adeno, rota, gripo virusas, taip vadinamas kiaulių gripas ir t.t.

Grybeliai: *Candida albicans*.

Poveikio trukmė

Higieninė rankų antiseptika EN 1500	30 sek
Chirurginė rankų antiseptika EN 12791	90 sek
Baktericidinis EN 13727, EN 1276	15 sek
Fungicidinis EN 13624, EN 1275	30 sek
Tuberkulicidinis EN 14348 (<i>M. terrae</i>)	30 sek
Su apvalkalu virusus	
ŽIV, hepatito B ir C virusai	15 sek
Vaccinia virusas	15 sek
Gripo virusas	15 sek
Be apvalkalo virusus	
Rota virusas	30 sek
Adeno virusas	60 sek

Naudojimas

Higieninė rankų antiseptika:

Trinti bent 3ml gaminio į sausas rankas 30-čiai sekundžių taip, kad visas rankų paviršius būtų padengtas. Rankos turi būti šlapios mažiausiai 30 sekundžių. Ypač didelį dėmesį skirti tarpupirščiams, pirštų galiukams, delnams, rankų šonams.

Chirurginė rankų antiseptika:

Chirurginiu būdu nuplautas sausas rankas ir alkūnes 2 kartus apdoroti pakankamu priemonės kiekiu (priklausomai nuo rankų dydžio). Poveikio trukmė: 90 sek.

Išpėjimas

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: *bespalvis, aiškus skystis*

Kvapas: *specifinis (alkoholis)*

Tirpumas: *visiškai tirpus bet kokių santykiu*

Tankis: *0,85 g/cm³ (20°C)*

Laikymo sąlygos

Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Atitiktis standartams

EN 1500, EN 12791, EN 1276, EN 13727, EN 1275, EN 13624, EN 14348, EN 14476

Kiti bandymų būdai

RKI/DVV

Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:

(A-01PNO601362-14-166)-BSV-7009

Pakuotė

500ml butelis

1L butelis

1L butelis dispenser

5L kanistras